

Perbezaan zika, denggi dan chikungunya

BH - 4/2/16 cm (210)

ZIKA

Gejala


Sakit belakang bola mata, muntah, cirit-birit dan sakit bahagian perut.

Tanda awal jangkitan

3 hingga 12 hari selepas terkena gigitan nyamuk

Jangka masa

4 hingga 7 hari. Gejala jangkitan akan berlaku secara klinikal atau sederhana. Simpton ini akan hilang sendiri tanpa sebarang rawatan.



Denggi

Tanda awal jangkitan

4 hingga 10 hari selepas gigitan


Jangka masa gejala

2 hingga 7 hari

Peringkat bahaya

Tanda amaran dan komplikasi akan berlaku selepas simptom pertama kemudiaman diikuti penurunan suhu badan (kurang 38°C).

Seterusnya kerap muntah, nafas laju, gusi berdarah, keletihan, muntah darah antara 24 hingga 48 jam di peringkat kritikal.



Chikungunya

Gejala

Pening, demam tiba-tiba, keletihan, loya dan muntah, ruam, sakit otot dan sendi.

Kesan lain

Dalam keadaan tertentu sakit sendi akan berterusan beberapa bulan dan ada yang bertahun. Komplikasi ini jarang berlaku tetapi ia sangat berbahaya kerana boleh membawa maut.

