

Kenali Cacar Monyet

Gejala



Nodus limfa bengkak

Simptom utama yang membezakan cacar monyet daripada penyakit cacar lain.



Otot berasa sakit




Demam

CACAR MONYET adalah sejenis jangkitan virus *monkeypox* yang berasal dari Afrika yang berbentuk cacar ringan. Sepanjang sedekad kes ini dilihat semakin meningkat secara mendadak. Pada Mei 2022 cacar monyet mula merebak ke Eropah dan Amerika Utara.

Dari mana asal cacar monyet?

CACAR MONYET ditemui di hutan hujan Afrika Barat dan Tengah. Akibatnya, dua varian utama virus wujud, satu berasal dari setiap rantau.



Cara merebak

MELALUI titisan hembusan pernafasan dalam dua cara:



1 Manusia

Sentuhan rapat, menyentuh kulis atau cecair badan dan juga menyentuh barang peribadi yang bersentuhan dengan kulis.






Sakit kepala



Ruam

Dalam tempoh 1 hingga 3 hari selepas demam, monyetpox dicirikan oleh ruam pustula yang bermula di muka dan merebak ke bahagian lain badan.




Strain Afrika Barat

Strain Afrika Barat ialah strain yang dikesan sedang merebak di luar Afrika.



Strain Afrika Tengah



2 Haiwan Sentuhan rapat, menyentuh kudis atau cecair badan, menggigit (mengaru) dan makan daging yang dijangkiti.

Bolehkah Cacar Monyet disembuhkan?

SEMBUH selepas 2 hingga 4 minggu manakala bagi kes yang serius, belum ada lagi rawatan yang dapat menyembuhkan. Beberapa kajian masih dijalankan dan sedang menanti kelulusan klinikal.

Fakta



Antivirus




Vaksin Imun Globulin



Vaksin cacar

GELARAN Cacar Monyet (*Monkeypox*) ditemui pada 1958. Penyakit ini kebiasaannya menjangkiti mamalia kecil dan tikus.

Namun terdapat dua wabak penyakit seperti cacar ditemui dalam koloni 'kera pemakan ketam' yang digunakan untuk tujuan penyelidikan.



CACAR MONYET adalah virus dari keluarga 'cacar' iaitu cacar kecil dan cacar lembu.

* Virus cacar biasanya berbentuk bata atau bujur dan mempunyai genom yang diperbuat daripada DNA *double-stranded*.